

Administrering av Alkindi®

Om din läkare eller annan vårdpersonal har ordinerat Alkindi, kommer denna folder att hjälpa dig förstå exakt hur behandlingen ska administreras.

Alkindi kan ges på tre olika sätt, beroende på åldern hos barnet eller ungdomen. Vi kommer att leda dig genom behandlingsadministrationen för tre olika åldersgrupper – den första är spädbarn under en månad gammalt, den andra är yngre barn och den tredje är äldre barn.



1

Spädbarn som är
under en månad
gammalt



2

Yngre barn



3

Äldre barn

Kom ihåg


Vid administrering av Alkindi finns det några saker du alltid bör ha i åtanke.



Tillsättning av granulat till vätska ska aldrig användas som administration, då detta kan resultera i att mindre än den fulla dosen ges. Det kan även ge en bitter smak.



Släng alltid den tomma kapseln utom räckhåll för små barn.



Om du har några frågor eller om du är osäker på hur Alkindi bäst kan administreras till ditt barn, oavsett barnets ålder så måste du alltid rådgöra med din läkare eller annan sjukvårdspersonal

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala



hydrokortison-granulat
i kapslar som ska öppnas

Produktinformation/bipacksedel i FASS

Alkindi (hydrokortison)RX. H02AB09. Granulat i kapslar avsedda att öppnas 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 5 mg. Förpackningsstorlek: 50 kapslar. Indikation: Ersättningsbehandling vid binjurebarkinsufficiens hos spädbarn, barn och ungdomar (från födseln till < 18 års ålder). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (SPC 08/10/2018). Patienter med dysfagi eller prematura spädbarn som ännu inte börjat inta peroralt. Särskilda varningar: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Kapseln får inte sväljas, kvävningrisk. Hållbarhet: 30 månader, efter första öppnandet: 60 dagar. Fullständig information och pris se FASS.se

Beredningsdatum: Maj 2019 Kod: 025-0519-ALK-HJ



hydrokortison-granulat
i kapslar som ska öppnas


Spädbarn under en månad gammalt



Varning: Alkindi-granulat levereras i en kapsel som måste öppnas innan användning. Släng sedan den tomma kapseln och se till att den är utom räckhåll för barn. Kapseln ska INTE sväljas - små barn kan kvävas

Hur man genom 5 enkla steg ger Alkindi till ett spädbarn som är under en månad gammalt.

STEG 1




Håll kapseln så att den tryckta texten är riktad uppåt och allt granulat har lagt sig i den nedre delen. Knacka på kapseln så att allt granulat lägger sig.

STEG 2



Kläm försiktigt botten av kapseln.

STEG 3



Vrid försiktigt toppen av kapseln.




Spädbarnet bör vid denna tidpunkt vaggas i den böjda armen som ger stöd för huvudet och fria luftvägar. Pressa försiktigt spädbarnets haka för att öppna munnen.

STEG 4



När spädbarnets mun är öppen, håll snabbt alla granulat från kapseln direkt på tungan - inte under tungan. Kontrollera att du kan se allt granulat ovanpå tungan. **Det är viktigt att alltid knacka på kapseln för att se till att allt granulat är avlägsnat.** Detta måste göras direkt - du bör aldrig spara Alkindi för framtida användning, du bör inte heller förbereda Alkindi i förväg.

STEG 5



Slutligen, när spädbarnet fått sin behandling, bör du ge det något att dricka - antingen genom bröstmatning eller flaska. Även om Alkindi är smakneutralt, kommer detta att säkerställa att allt granulat har svalts. **Det var allt. Du kommer nu att kunna administrera Alkindi säkert till ett spädbarn som är under en månad gammalt.**


Yngre barn



Varning: Alkindi-granulat levereras i en kapsel som måste öppnas innan användning. Släng sedan den tomma kapseln och se till att den är utom räckhåll för barn. Kapseln ska INTE sväljas - små barn kan kvävas


Om barnet är under 6 år gammalt och kan matas med sked, då bör du ge Alkindi på det sättet. Det finns fem enkla steg.

STEG 1




Håll kapseln så att den tryckta texten är riktad uppåt och allt granulat har lagt sig i den nedre delen. Knacka på kapseln så att allt granulat lägger sig.

STEG 2



Kläm försiktigt botten av kapseln.

STEG 3



Vrid försiktigt toppen av kapseln.

STEG 4



Nu finns det två alternativ för administration tillgängliga för dig.




Antingen kan allt granulat hållas direkt på en sked och stoppas i barnets mun, eller...



...om barnet kan äta porös mat, strö granulat över en full sked av kall eller rumstempererad porös mat, som yoghurt eller fruktpuré.

STEG 5



Oavsett vilken metod du använder, kom ihåg att det är viktigt att alltid knacka på kapseln för att se till att allt granulat är avlägsnat. Det måste ges direkt - du bör aldrig spara Alkindi för framtida användning, du bör inte heller förbereda Alkindi i förväg.

Slutligen, när barnet har fått sin behandling, bör du ge det något att dricka direkt för att vara säker på att alla korn är svalda. Även om Alkindi är smakneutralt, kommer detta att säkerställa att allt granulat har svalts. Du bör nu kunna administrera Alkindi säkert till ett litet barn.

Äldre barn



Varning: Alkindi-granulat levereras i en kapsel som måste öppnas innan användning. Släng sedan den tomma kapseln och se till att den är utom räckhåll för barn. Kapseln ska INTE sväljas - små barn kan kvävas


Om barnet kan ta Alkindi på egen hand, då finns det fem enkla steg som bör följas.

STEG 1




Håll kapseln så att den tryckta texten är riktad uppåt och allt granulat har lagt sig i den nedre delen. Knacka på kapseln så att allt granulat lägger sig.

STEG 2




Kläm försiktigt botten av kapseln.

STEG 3



Vrid försiktigt toppen av kapseln.



Ta det direkt. Tugga inte granulatet. Se till att alltid ta allt granulat direkt - du bör aldrig spara Alkindi för framtida användning, du bör inte heller förbereda Alkindi i förväg.

STEG 4



Håll granulatet direkt ovanpå tungan och inte under. **Det är viktigt att alltid knacka på kapseln för att se till att allt granulat är avlägsnat.**

STEG 5



Slutligen, ta något att dricka direkt efter att behandlingen givits. Även om Alkindi är smakneutralt, kommer detta att säkerställa att allt granulat har svalts.